

PELVIC INFLAMMATORY DISEASE EN HET TUBO-OVARIEEL ABCES (PID / TOA)

Versie 1.0

Discipline
Verantwoording

Monodisciplinair
NVOG

Pelvic inflammatory disease

Klik op onderstaande link voor de richtlijn Pelvic Inflammatory disease (PID) die is gesitueerd op de landelijke richtlijndatabase (zie ook: <http://richtlijndatabase.nl/> voor het totale aanbod van alle medisch specialismen)

http://richtlijndatabase.nl/richtlijn/pelvic_inflammatory_disease/pid_diagnostiek.html

LET OP:

Addendum bij richtlijn PID:

In deze richtlijn wordt als eerste keus voor intraveneuze behandeling Ofloxacin geadviseerd (in combinatie met Metronidazol, maar dit blijkt niet meer in de intraveneuze vorm leverbaar. De werkgroep PID-TOA heeft nu als alternatief voor Levofloxacin (de actieve vorm van Ofloxacin) gekozen, 500 mg 2dd, wat wel in de intraveneuze vorm leverbaar is.

Ofloxacin oraal is wel leverbaar, en blijft daarom de eerste keus (in combinatie met metronidazol) voor de orale behandeling van PID.

Disclaimer

De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor attentie op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail: info@nvog.nl).