

Zwangere vrouw met mogelijk COVID 19

RIVM criteria <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>

ASYMPTOMATISCH
of milde klachten

SARS-CoV-2 test via huisarts

SARS-CoV-2 Negatief

SARS-CoV-2 Positief

Geen opname indicatie niet vitaal bedreigd
NETHOSS melding via ziekenhuis bij pos test**
Thuisisolatie met monitoren klachten en T tot 24 uur klachtenvrij
<https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/thuisisolatie>
Routine obstetrische controles minimaal uitstellen tot opheffen thuisisolatie
Monitoren via MEOWS indien thuispartus.
Verwijzen voor ziekenhuis zorg bij MEOWS ≥ 3

Geen verdere actie

SYMPTOMATISCH
Volgens casusdefinitie ziekenhuis

SARS-CoV-2 test
Verloskundig consult met **vitals#** met persoonlijke bescherming

SARS-CoV-2 Positief of volgt

Verloskundige opname indicatie of vitaal bedreigd
Isolatie volgens protocol
Beschermdende maatregelen voor ZH personeel
Materiaal voor bevalling in kamer
NETHOSS melding via ziekenhuis bij pos test**

Zwangere > 24wk en < 32 wk en vitaal bedreigd **met bewezen of waarschijnlijk** COVID-19 opname in tertiair centrum met IC-neonatalogie*

Zwangere < 24 wk of > 32 wk en vitaal bedreigd **met bewezen of waarschijnlijk** COVID-19 opname in centrum met IC faciliteit

Groeiecho's a twee weken

OPNAME IN ZIEKENHUIS

Maternaal: Vitals: #Temp, HF, RR, AH, saturatie, bewustzijn, urineproductie (MEOWS) a 1 uur. Spoed interventie team (SIT) inroepen volgens lokaal protocol.

Lab: Bloedkweken, bloedbeeld: leuko diff, CRP, elektrolyten, arterieel bloedgas, lactaat, glucose, D-Dimeer, nierfunctie, leverfunctie (ASAT, ALAT, LDH, Bilirubine en CK).

Beeldvorming: Pulmonale diagnostiek (low-dose CT thorax)

Management: Corticosteroïden op foetale indicatie. IV antibiotica volgens lokaal protocol. Antistolling.

Foetaal: Harttonen of CTG (afh van termijn), groei/dopplers op indicatie

ALARMSYMPTOMEN

HYPOXIE, SNELLE ADEMHALING, VERWARDHEID, SEPTISCHE SHOCK, MULTI ORGAAN FALEN, FOETALE NOOD

BEVALLING > 24 weken

Bij bewezen/waarschijnlijk COVID-19 tijdens zh opname of bewezen COVID-19 in thuisisolatie en MEOWS ≥ 3

Isolatie volgens lokale afspraken

Geen contra-indicatie vaginale bevalling

Saturatie a 1 uur

CTG bewaking durante partu

Laat afnavelen

Kind***

Kind opnemen bij moeder in sluiskamer, tenzij opname indicatie neonaat om andere reden

Placenta naar PA na afname SARS-CoV-2 RT-PCR met vraagstelling tekenen infectie

Borstvoeding met mondkap en hygiëne maatregelen (handen wassen voor het aanraken van de baby, borsten, eigen borstkolf of fles)

Goed schoonmaken van eigen borstkolf na gebruik

Overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven

* Als patiënte instabiel bevallen op locatie en kind ophalen door NICU

** Bij vragenover Nethoss registratie; info@nethoss-perined.nl

*** <https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-covid-19?dossierid=26542080>