


# Vulva - FIGO en TNM codering

**Bij gebruik van onderstaande modules en onderdelen uit het leerportaal gaat gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden:**

1. Alle e-learning modules en alle onderdelen ervan zijn specifiek ontwikkeld door IKNL ten behoeve van de interne Opleiding Registratie NKR voor datamanagers van IKNL. De lesstof is uitdrukkelijk NIET bedoeld als medische opleiding. IKNL is houder van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op voornoemde modules en onderdelen.
3. Gebruiker wordt geacht het lesmateriaal in de geest van het genoemde bij 1. te gebruiken. Het is gebruiker te allen tijde verboden om de modules of onderdelen ervan te kopiëren, te bewerken, of anderszins, in welke vorm dan ook, voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van IKNL.
4. IKNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van het lesmateriaal of voor gevolgen die door (onjuist) gebruik van het lesmateriaal ontstaan.

Registratie NKR  
Gynaecologie-Vulva

**Stadium**



Klik op de onderwerpen hiernaast.

1. FIGO

2. T - primaire tumor

3. N - regionale lymfeklieren

4. M- afstand metastasen

5. Oefeningen

2/12

Introductie

Diagnostiek

Pathologie

**Stadium**

Behandeling

Follow Up

## Stadium

### FIGO

De **FIGO-classificatie** is de wijze waarmee in de gynaecologie het stadium van gynaecologische tumoren wordt ingedeeld. Naast de TNM-classificatie van maligne tumoren, wordt in de gynaecologie het FIGO-classificatie systeem gehanteerd.

#### TNM-classificatie en FIGO-stadiëring Vulva

De FIGO-classificatie van vulvacarcinomen is gebaseerd op chirurgische stadiëring. Hieronder en op de volgende pagina staat de FIGO-classificatie in tabelvorm weergegeven.

| TNM       | FIGO      | Definitie                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b> | <b>I</b>  | <b>Tumor beperkt tot vulva of vulva en perineum</b>                                                                                                                        |
| T1a       | IA        | Tumor ≤2 cm en met stromale invasie ≤1 mm                                                                                                                                  |
| T1b       | IB        | Tumor >2 cm en met stromale invasie >1 mm                                                                                                                                  |
| <b>T2</b> | <b>II</b> | <b>Tumor invasie in ieder van de volgende structuren: onderste 1/3 urethra, onderste 1/3 vagina, anus. Geen lymfekliermetastasen.</b>                                      |
| <b>T3</b> |           | <b>Tumorinvasie in ieder van de volgende perineale structuren: bovenste 2/3 deel urethra, bovenste 2/3 vagina, blaas mucosa, rectum mucosa of gefixeerd aan het bekken</b> |

3/12

<
Introductie
Diagnostiek
Pathologie
Stadium
Behandeling
Follow Up
>

## Stadium

| TNM       | FIGO       | Definitie                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>III</b> | <b>Tumor ongeacht grootte met uitbreiding in bovenste deel van aanliggende perineale structuren, of elk aantal niet-gefixeerde/niet-geulcereeerde lymfeklieren.</b>               |
|           | IIIA       | Tumorinvasie in ieder van de volgende peritoneale structuren: bovenste 2/3 deel urethra, bovenste 2/3 vagina, blaas mucosa, rectum mucosa of regionale lymfekliermetastasen ≤5 mm |
|           | IIIB       | Lymfekliermetastasen >5 mm                                                                                                                                                        |
|           | IIIC       | Lymfekliermetastase met extracapsulaire uitbreiding                                                                                                                               |
|           | <b>IV</b>  | <b>Tumor ongeacht grootte gefixeerd aan het bekken of gefixeerde of geulcereeerde regionale lymfekliermetastase of afstandmetastasen</b>                                          |
|           | IVA        | Tumor gefixeerd aan het bekken, of gefixeerde of geulcereeerde regionale lymfekliermetastasen                                                                                     |
| <b>M1</b> | <b>IVB</b> | <b>Afstandsmetastasen (inclusief lymfekliermetastasen in het bekken)</b>                                                                                                          |

4/12

<
Introductie
Diagnostiek
Pathologie
Stadium
Behandeling
Follow Up
>

## Stadium

### T - primaire tumor

### Stadium T1

### Stadium T2

### Stadium T3

De TNM-classificatie van de vulva geldt alleen voor carcinomen.

De bepaling van het stadium is gebaseerd op informatie verkregen uit klinisch onderzoek.  
Het klinisch onderzoek bestaat uit:

- lichamelijk onderzoek
- endoscopie
- beeldvorming



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up

5/12

## Stadium

### T - primaire tumor


### Stadium T1

### Stadium T2

### Stadium T3

T1a: tumor  $\leq 2$  cm en met stromale invasie  $\leq 1$  mm

T1b: tumor  $> 2$  cm en met stromale invasie  $> 1$  mm



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up

5/12

## Stadium

T - primaire tumor


Stadium T1

Stadium T2

Stadium T3

T2: tumorinvasie in ieder van de volgende structuren:

- onderste 1/3 urethra
- onderste 1/3 vagina
- anus



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up

5/12

## Stadium

T - primaire tumor


Stadium T1

Stadium T2

Stadium T3

T3: tumorinvasie in ieder van de volgende perineale structuren:

- bovenste 2/3 deel urethra
- bovenste 2/3 vagina
- blaasmucosa
- rectummucosa
- of gefixeerd aan het bekken



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up

5/12

## Stadium

### N – regionale lymfeklieren

#### Stadium N1

#### Stadium N2

#### Stadium N3

Lichamelijk onderzoek is een minimale vereiste om de regionale lymfeklieren te kunnen onderzoeken.

De regionale klieren zijn de inguinofemorale lymfeklieren.

6/12



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up



## Stadium


### N – regionale lymfeklieren

#### Stadium N1


#### Stadium N2

#### Stadium N3

N1a: 1 of 2 lymfekliermetastase(n) elk <5 mm



N1b: 1 lymfekliermetastase ≥5 mm



6/12



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up



## Stadium

### N – regionale lymfeklieren

### Stadium N1



### Stadium N2

### Stadium N3

N2a: 3 of meer  
lymfekliermetastasen, elk <5 mm

N2b: 2 of meer  
lymfekliermetastasen ≥5 mm

N2c: lymfekliermetastase met  
extracapsulaire verspreiding



6/12



Introductie

Diagnostiek

Pathologie

Stadium

Behandeling

Follow Up



## Stadium


### N – regionale lymfeklieren

### Stadium N1

### Stadium N2

### Stadium N3

N3: gefixeerde of geïlcereerde regionale  
lymfekliermetastase



6/12



Introductie

Diagnostiek

Pathologie

Stadium

Behandeling

Follow Up






## Stadium


### M - afstandsmetastasen

M1: metastasen op afstand (inclusief lymfekliermetastasen in het bekken)



The cancer  
has spread  
to the lungs

Cancer cells in  
the lymph nodes  
in pelvis



Introductie



Diagnostiek



Pathologie



Stadium



Behandeling



Follow Up

7/12

